



# زبان و مراثی پاز آن

فصل ۵

## بارداری و زایمان

گریه نوزاد، نشانه دیگری از معجزه عشق و زندگی میان زوجین است که پیوندشان را مستحکم تر کرده اند.

نخستین کلمه ای که کردک به زبان می آورد، اولین قدمی که بر می دارد، نخستین دندانی که در می آورد، اولین جشن تولدی که برایش گرفته می شود از نقاط عطف زندگی زناشویی به شمار می آیند. یکی از بهترین هدایایی که زوجین می توانند به یکدیگر بدهند و پیوندشان را مستحکم کنند، تولد فرزند است؛ بنابراین باید برای تغییرات اجتناب ناپذیری که تولد فرزند در روش زندگی شما ایجاد خواهد کرد، آماده شوید.

## عزيزم، فکرمی کنم بچه می خواهد بیرون بیاید!

کردک شما، در شرایط عادی، با بروز علایم و نشانه هایی اعلام می کند زمان زایمان نزدیک است. برخی از این علایم و نشانه ها شامل عدم افزایش وزن و بالا و پایین رفتن نوزاد است؛ در این حالت ممکن است بتوانید راحت تر نفس بکشید.

اگر هیچ یک از علایم و نشانه ها نمایان نشد، نگران نشوید. احتمالاً فرزندتان می خواهد از روش دیگری برای اعلام زمان زایمان استفاده کند. توجه داشته باشید هر یک از نژادان، از روش خاصی برای اطلاع دادن زمان تولد خود استفاده می کنند.





## هنگام فرا رسیدن زمان زایمان

علائم و نشانه های زایمان شامل خروج ترکیب خون و مخاط و انقباض های مکرر و دردناک است. علائم فوق به همراه پاره شدن کیسه آب نمایان می شود. در صورت پارگی کیسه آب بدون بروز علائم و نشانه های فوق، باید به پزشک مراجعه کرد.

زایمان و به دیا آمدن نوزاد در سه مرحله انجام می گیرد که عبارتند از:

**مرحله اول:** وقتی که گردن رحم باز می شود.

**مرحله دوم:** زمانی که انقباض های رحمی مادر، نوزاد را به بیرون هل می دهد.

**مرحله سوم:** این مرحله زمانی اتفاق می افتد که نوزاد از بدن مادر خارج شده و زایمان به پایان رسیده است.

## درد زمان انقباض ها

باید بدانید هنگامی که انقباض ها نامنظم هستند، درد زایمان واقعی نیست. درد زایمان واقعی، زمانی نمایان می شود که انقباض ها منظم باشند و تکرار شوند. در این شرایط، کیسه آب برخی از مادران پاره می شود. نفس عمیق بکشید تا انقباض ها، سبب عصبی شدن شما نشود به محض شروع شدن هرگونه انقباضی با پزشک خود تماس بگیرید. ساک خود را آماده کنید و به بیمارستان بروید.

## عوارض هنگام زایمان

روش های طبی که به تولد نوزاد کمک می کند استفاده کرد.  
یکی از راه های مقبله با درد زایمان، استفاده از مسکن ها است؛ اما بخاطر داشته باشید سالم ترین روش وضع حمل، زایمان طبیعی است.

ضمن اینکه فردی که نوزاد خود را با سازارین به دنیا می آورد، پس از تولد کودک عوارض سازارین و دردهای ناشی از جراحی را تجربه خواهد نمود.  
در صورت نیاز برای کاهش یا از بین بردن دردهای زایمانی از روش های استنشاقی، تزریقی و اپیدورال استفاده می کند.

### آرامش و تنفس

آموختن روش های آرامش در هنگام زایمان، علاوه بر تسکین درد، انرژی مورد نیاز مادر برای بیرون راندن نوزاد از رحم را ذخیره می کند. آموختن روش های تنفس آرام، علاوه بر تسکین درد مادر، به آرامش نوزاد نیز کمک می کند. وقتی انتباخت ها آغاز می شوند از بینی دم و ذهان بازدم کنید.  
وقتی انتباخت ها به اوچ رسیدند، به سرعت و متعاقب لایین رفتن آنها عمیق نفس بکشید. آرامش و تنفس طبیعی را بین انتباخت ها فراموش نکنید.

## مراقبت از نوزاد

روز و شب برای نوزادان تفاوت ندارد و باید در کلیه ساعت های شباهه روز به آنها توجه و رسیدگی کرد. اکثر نوزادان در شب های هفته نخست به دنبی آمدن، بین چهار تا شش ساعت می خوابند. باید هر وقت که نوزاد شما احتیاج داشت، به او شیر بدھید و پوشک اورابه دفعات عرض کنید.  
وقتی بچه دار می شوید، وظایف شما تغییر می کند و باید وقت آزاد و علایق خود را به شکلی مدیریت کنید تا رسیدگی به فرزند برای شما امکان پذیر شود. پس از برنامه ریزی و محاسبه میزان ساعت های موردنیاز برای خواب، برای انجام دادن کارهای روزمره برنامه ریزی کنید.

زایمان برای اکثریت زنان ساده است و هیچ مشکلی ندارد؛ اما در برخی از زایمان ها عوارضی بروز می کند که قبل پیش یافته نیستند.  
بعضی وقت ها، حتی بهترین برنامه ریزی ها برای زایمان بدون عوارض نیز به نتیجه نمی رسد. در این شرایط، باید از تدابیر مختلف برای کنترل و رفع عوارض استفاده کرد.

### اپیزیوتومی

اپیزیوتومی، برشی بر روی لگن و دیواره خلفی واژن است که در صورت نیاز، در طول مرحله دوم زایمان ایجاد می شود. این برش خروج چنین و وضع حمل را آسان تر می کند.

### تولد پا پا

به صورت عادی در نزدیک زمان زایمان، بچه در رحم می چرخد؛ به نحوی که سراوه سمت کانال زایمان قرار می گیرد یک سوم کل نوزادان تا هفته ۳۴ بارداری در موقعیت تولد با پا قرل دارند و پس از آن، به حالت عادی، یعنی تولد با سر در می آیند. در تعدادی از موارد، این چرخش اتفاق نمی افتد و ابتدا پاهای بچه از رحم خارج می شوند.

### کاهش درد زایمان

زایمان، تراوم با دردهای ناشی از انتباختات رحمی است که با هر انتباخت با اندروفین تولید شده در بدن مادر کاهش می یابد. برای کاهش این دردها می توانید از تکنیک های تنفسی و روش های زایمان بدون درد استفاده کنید. برای کنترل درد زایمان می توان از

## گریه کردن

نوزادان در چند ماه اول زندگی ممکن است گریه کنند. آنها با گریه کردن، ناراحت بردن خود را از وجود مشکلی نشان می‌دهند. دلایل گریه نوزاد به این شرح است:

- او ممکن است گرسنه باشد، حتی اگر دو ساعت قبل شیر خورده باشد.
- لذای باید به طور مکرر تغذیه شود.
- پرشک او خیس یا کشیف است.
- آنچه خیلی گرم است (دماهی هوای ۲۴ درجه سلسیوی گرد براي نوزادان اينده آل است)

اگر فرزند شما چند ساعت متواالی - به خصوص بعد از ظهر - گریه می‌کند، ممکن است از قولنج یا به عبارتی دردهای حاد و دوره‌ای شکمی در رنج باشد براي درمان اين مشکل، با پرشک مشورت کنید.

بازگشت به خانه از بیمارستان و بودن کنار اعضای خانواده، شادی آفرین است. شما می‌توانید با برنامه ریزی مناسب، همه نیازهای فرزند خود را تامین کنید.

## برخی رفلکس‌های یا واکنش‌های غیرارادی نوزاد

نوزادان با رفلکس یا واکنش‌های غیرارادی خاصی که به آنها برای زنده ماندن کمک می‌کنند، به دنیا می‌آیند. به عنوان مثال، نوزادان بلافصله پس از به دنیا آمدن، ترتیبی جستجوی پستان را خواهند داشت.

**واکنش جستجوی پستان:** در صورت تماس نرک پستان مادر به گونه یالب‌ها، او سرش را به طرف پستان چرخانیده و دهانش را باز می‌کند.

**واکنش غیرارادی مورو (Moro):** اگر بدن کودک تحریک شود، اندام‌هایش را متقبض کرده و دست‌هایش را مشتم خواهد کرد.

## پیوند

تولد فرزندتان، ممکن است دلشوره شمارا که ۹ ماه برای این لحظه انتظار کشیده اید، افزایش دهد. ایجاد و افزایش رابطه جسمی و عاطفی با کودک، از رحم مادر شروع می‌شود نوزادان معمولاً در ساعت‌های نخست زندگی بسیار هوشیار و پاسخگو هستند. نوزادان تازه متولد شده به شکل غریزی با والدین خود ارتباط برقرار می‌کنند.

## تغذیه با شیر مادر

شما باید نحوه تغذیه با شیر مادر را آموخته باشید. تغذیه با شیر مادر برای اکثر مادران، کاری آسان و بدون دردرس است. فرزند شما، باید در طی ساعت اول پس از تولد در حین انجام تماس پرست با پرست با مادر، با شیر مادر تغذیه شود. شروع زود هنگام این کار، کمک می‌کند تا معلمین شوید تغذیه با شیر مادر، تجربه ای لذت‌بخش برای شما و فرزند دلیندتان است. تغذیه با شیر مادر، به پیشگیری از ابتلای کودک شما به بیماری‌ها و حفظ و ارتقای تندرنستی او کمک می‌کند.

## حمام کردن و تعویض پوشش

سعی کنید این کار را در ساعات معینی از روز با استفاده از آب و لرم، انجام دهید. به خاطر داشته باشید بند ناف نوزاد همیشه تمیز باشد.

## آروغ زدن و پرگرداندن شیر

برخی از نوزادان هنگام خوردن شیر، هوانیز می‌بلعند که باعث ناراحتی آنها می‌شود. کودک را در حالت عمودی نگه دارد و آرام به پشت او بزنید تا آروغ بزند. ممکن است فرزند شما پس از آروغ زدن، اندکی از شیر را برگرداند؛ با استفاده از حوله یا پیش بند نوزاد، آن را پاک کنید.

# عزیزم، به استراحت نباز دارم

## ■ تورم پستان‌ها

بهترین روش برای پیشگیری کردن از درد پستان‌ها تغذیه با شیر مادر است. شما می‌توانید با استفاده از یک حوله گرم یا سرد و مرطوب از تورم پستان‌ها بکاهید. پس از زایمان و با خروج جفت از رحم، این درد که معمولاً شدید نیست ایجاد شده و بعد از مدتی ناپدید می‌شود.

## ■ لوکیا

تا شش هفته پس از زایمان، ممکن است ترشحات واژنی شامل خون، مخاط و بافت‌های مریب‌بط به جنین، ادامه داشته باشد. با استفاده از نوار بهداشتی می‌توانید ترشحات واژنی را تا آغاز دوره کامل عادت ماهانه کنترل کنید.

## بخیه‌ها

اکثر بخیه‌ها پس از پنج روز جذب می‌شوند پس از حمام کردن، محل بخیه‌ها را با حوله خشک کنید. با سن تان را با آب بشویید. پاسمنان را هر چند ساعت یک بار عرض کنید. از ابتلا به بیروت پیشگیری کنید. اگر پس از این مدت، بخیه‌ها باعث ناراحتی شما می‌شوند، سعی کنید روی یک حلقه لاستیکی بنشینید.

# «آرام باشید و از قرار گرفتن در کنار فرزندتان لذت ببرید.»

استراحت و خواب کافی در روزهای بعد از وضع حمل، ضروری است بروزه در ده روز نخست پس از زایمان، به اندازه کافی استراحت کنید تا توان از دست رفته خود را بازیابی کنید.

## ■ ورزش کردن

ورزش در روزهای نخست پس از زایمان، به مدت پنج دقیقه در روز، می‌تواند از ایجاد لخته خون پیشگیری کند.

## ■ عضلات دردناک

ممکن است متعاقب زایمان، عضلات بدن شما با قرقره گرفتن در موقعیت‌های مختلف دردناک شود.

## ■ التهاب در دستگاه تناسلی و پستان

ممکن است در ولّن و مقعد شما التهاب و حساسیت ایجاد شده باشد.

## مبارزه با خستگی

ترصیه‌های ما برای رفع احساس خستگی پس از زایمان بدین شرح است: استراحت در ساعت‌هایی که نوزاد خواب است، مصرف مکمل‌ها مطابق دستورالعمل‌های بهداشتی، پیروی از رژیم غذایی متعادل، نوشیدن فراوان مایعات و در صورت از میان نرفتن آثار خستگی، مراجعت به پزشک

## زمان آغاز رابطه جنسی

اکثر زوجین، پس از گذشت شش هفته از تولد فرزند، رابطه جنسی را آغاز می‌کنند. اگر شما یا همسرتان با آغاز مجدد رابطه جنسی پس از گذشت این مدت مشکل دارید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.



## عزیزم، بچه می خواهد با توبازی کند!



تا زمانی که دوران نقاوت همسر شما پایان یابد، وقت خود را صرف نگهداری و لذت بردن از فرزند تازه متولد شده کنید. همچنین می توانید در پروسه حمام کردن و تعریض پوشک نوزاد کمک کنید.

**فرزندتان را المس کنید**

لمس کردن نوزاد، علاوه بر برانگیختن احساس پدری، فراید بسیاری از جمله فراید عاطفی و ذهنی دارد.

**فرزندتان را بغل کنید**

هنگامی که فرزند شما خیلی کوچک است، ممکن است دست و دل شما برای بغل کردن او بلرزد و اعتماد به نفس تان را از دست دهید. اعتماد به نفس داشته باشید، چون غراییر طبیعی تان به شما کمک می کنند تا فرزند خود را به خوبی بغل کنید.

**فرزندتان را ماساژ دهید**

ماساژ دادن مایلیم فرزند سبب تحکیم پیوند پدر و کودک می شود. با فرزندتان حرف بزنید

حرف زدن با کودک سبب تحکیم ارتباط با او می شود.

به کار تغذیه با شیر مادر کمک کنید

شمامی توانید پس از تعریض پوشک نوزاد، اورابرای تغذیه با شیر مادر به همسر خود تحریل دهید.

## سوال و جواب

اینک یک بار دیگر باید با هم چند سوال و جواب مهم را مرور کنیم.



**سوال:** با توجه به این که به زمان زایمان نزدیک می شوم، نگران نگهداری فرزندم در چند هفته ابتدایی به دنیا آمدنش هستم. در بیمارستان با کسی می توانم حرف بزنم؟

**جواب:** بله. می توانید با مسئولان بیمارستان و پزشک خود گفت و گو کنید. در ضمن، پزشک متخصص اطفال نیز فرزند شما را معاينة می کند و پس از اطمینان از سالم بودن نوزاد، اجازه خواهد داد تا اورا به خانه ببرید. در صورت لزوم می توانید از او نیز راهنمایی بخواهید.

**سوال:** پسرم پنج هفته زودتر از زمان مقرر به دنیا آمده و دو هفته در دستگاه تغذیه شده است. آیا او ضعیف و لاگر می شود؟

**جواب:** خیر، در ابتدا باید به تغذیه کردکان نارس رسیدگی کرد. در ابتدا باید کودک را با شیر مادر پس از دوشیدن از طریق فنجان و تماس مستقیم با پستان مادر جهت تحریک تولید شیر تغذیه نمود و سپس به محض این که توانایی مکیدن را کسب کرد مستقیماً از پستان مثل سایر نوزادان تغذیه شود.

**سوال:** بستگان من می گویند برای جلوگیری از لوس شدن فرزند دو ماhe ام، نباید به گریه کردنش اهمیت دهم. چه کنم؟

**جواب:** نوزادتان در این سن، تنها با گریه کردن می تواند جلب توجه کند بی توجهی به نوزادتان سبب ناراحتی او و شما می شود.

**سوال:** فرزندم، روزانه ساعت ها گریه می کند. چه کنم؟

**جواب:** گریه کردن نوزادان تازه به دنیا آمده طبیعی است. ابتدا با مراجعته به پزشک مطمئن شوید فرزند شما به بیماری خاصی مبتلا نیست. اورا حمام کنید. به نکاتی که پیش از این دریلره دلایل احتمالی برای گریه نوزاد مطرح کردیم، توجه کنید.

**سوال:** همسرم می خواهد در طول زایمان کنارم باشد، چه کنیم؟

**جواب:** برخی از بیمارستان ها در شرایط عادی اجازه می دهند همسران زنان باردار، طی زایمان، در کنار آنها باشند. اگر بیمارستان شما هم به شما این اجازه رامی دهد، از این فرصت استفاده کنید.

### یک داستان - به کمک علی

پس از جشن اولین سالگرد ازدواج مان تصمیم گرفتیم بچه دار شویم. وقتی باردار شدم، هر دوی ما خوشحال و در عین حال، هیجان زده و نگران بودیم. مستویت بارداری، به دنیا آوردن بچه و بزرگ کردن او سنجین بود و مارانگران کرده بود. اما باید بگوییم ثبت نام و شرکت کردن در کلاس های فرزندپروری، نقش اساسی در از میان رفتن ترس های مان داشت. این کلاس دربرگیرنده مطالب کاربردی و خوبی بردا.

با استفاده از آنچه در این کلاس یاد گرفتم، از تکنیک های آرامش و تنفس در طول ۱۴ ساعت زایمان استفاده کردم؛ در دش بسیار کمتر از حد تصورم بود. وقتی همسرم علی، فرزندمان را به من داد، مرجحی از عواطف و احساسات را تجربه کردم و بی اختیار اشک شرق ریختم.

آمدن من و فرزندمان به خانه با حضور اعضای خانوارde به جشن بزرگی بدل شد. اسمش را راضا گذاشتیم. مراقبت از فرزند، شبیه قدم زدن در پارک نبود، اما با کمک علی و مادرش، موفق شدم از عهده این کلربر آیم. از هر فرصتی برای شیر دادن، حرف زدن، لایبی خواندن و قرآن خواندن برای او استفاده می کردم. با این کار به آموزش های زودهنگام فرزندمان نیز کمک کردم.

علی، پس از بازگشت به خانه، او را به حیاط می برد تا در استخر پلاستیکی که داشتیم آب بازی کند. این کار علی، سبب شد رابطه پدر و پسر نزدیک تر شود. پس از بچه دار شدن، زندگی ماسرشل از شادی و محبت شد. تصمیم گرفته ایم پس از سه ساله شدن رضا، برای او یک خواهر یا برادر به دنیا آوریم.



## نقش های همسران پس از زایمان

پس از به دنیا آمدن فرزند، مادر به شدت، احساس خستگی خواهد کرد به عنوان یک مادر، ممکن است به علت تغییرات هورمونی، جسمی و روحی، دچار افسردگی پس از زایمان شوید به دلیل حضور اعضای خانواده در خانه، ممکن است به حفظ رابطه با همسر و تندرستی خود توجه نکنید با همسر خود صحبت کنید و از او در نگهداری از فرزندتان کمک بگیرید.

از شهرهای بابت درک احساسات خود تشکر کید ورزش و استراحت، نقش اساسی در سرعت بخشیدن به روند بهبود شما دارد برای برآورده کردن نیازهای جنسی همسر خود از روش های خلاصه استفاده کنید.

برای مرد، باور و فرزندبه خانوارده، تغییرات گسترده ای ایجاد می شود باید به تغییرات هورمونی، جسمی و روحی همسر خود، توجه و نیازهای او را برآورده کنید. ممکن است احساس نادیده گرفته شدن به شما فشار آورد. برقراری رابطه سالم و مناسب می تواند کمک کند تا احساسات خود را به راحتی و با آرامش بیان کنید.

ممکن است در طول دوران بارداری همسر خود، از نظر جنسی با کمبود مواجه می شوید؛ با همسر خود در این باره حرف بزنید و راه حل مناسبی بیابید.

## مراحل رشد و تکامل کودک



محدوده	مرحله مهم زندگی کودک
۱ تا ۸ هفته‌گی	لبخند
۱ تا ۲ ماهگی	بلند کردن مختصر سر
۳ ماهگی	گنترل مناسب سر
۴ تا ۶ ماهگی	برگشتن
۴ تا ۵ ماهگی	تلاش برای رسیدن به اشیا
۷ تا ۹ ماهگی	نشستن بدون کمک والدین
۴ تا ۱۲ ماهگی	نخستین دندان
۶ تا ۹ ماهگی	خریدن
۸ تا ۱۴ ماهگی	ایستادن بدون کمک والدین
۸ تا ۱۵ ماهگی	دست نگان دادن، دست زدن
۹ تا ۱۸ ماهگی	راه رفتن بدون کمک والدین
۹ تا ۱۵ ماهگی	به زبان آوردن کلمات (بابا، مامان)
۱۵ تا ۳۰ ماهگی	جمله بندي

شیرین ترین لحظات زندگی، بارشد و انجام کارهای جدید توسط فرزند دلبتنان در انتظار شماست. در طی مراحل رشد و نمو، فرزند شما در هر سنی فعالیت خاصی را شروع می کند. در انتهای این مبحث باید بینیم چه زمانی باید منتظر این اتفاقات شیرین باشیم.